

## *Le Storie Napoleoniche*

a cura del Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica

Numero 56 – 27 Maggio 2023

[medaglierenapoleonico@gmail.com](mailto:medaglierenapoleonico@gmail.com)

[www.medaglierenapoleonico.com](http://www.medaglierenapoleonico.com)

## *Il Giardino di Josephine*

### *7<sup>a</sup> parte*

In questa rubrica, mese dopo mese, vi mostreremo quali bellezze floreali contenesse il giardino della Malmaison al tempo di Giuseppina, attraverso le magnifiche incisioni del più grande illustratore botanico del suo tempo, Pierre-Joseph Redouté.

Costui, in collaborazione con un famoso botanico parigino, Etienne Pierre Ventenat, pubblicò dal 1803 al 1806 “Le Jardin de la Malmaison” un’opera divenuta una pietra miliare dell’illustrazione botanica, in cui vengono descritti oltre centoventi specie di rose e non solo, con cui l’amata prima moglie di Napoleone volle impreziosire la loro residenza privata alle porte di Parigi.

Josephine, che non faceva mai nulla di ordinario, non si accontentò di decorare il grande parco che circondava la residenza con specie floreali comuni, volendo invece che vi fossero impiegate solo essenze e specie mai prima impiantate in Francia trasformando così il proprio giardino in una sorta di museo botanico a cielo aperto.

Ancora oggi il giardino conserva alcune delle piante da lei volute anche se il passare del tempo e la mancanza della sua mano amica dei fiori, gli ha fatto perdere gran parte del suo fascino.



*Crocus sativus.*

*Icones per P. F. Ravenel.*

*Icones per P. F. Ravenel.*

## CROWEA.

FAM. des RUTACÉES, *Juss.* — DÉCANDRIE MONOGYNIE, *Linn.*

CHARACTER REFORMATUS. *Calix* pentaphyllus; foliis unguiculatis, in tubum approximatis. *Petala* quinque, hypogyna, sessilia. *Stamina* decem, disco hypogyno inserta: filamentis ad basim planis, ciliatis, in tubum approximatis, versus apicem subulatis, patentibus, villosis; antheris medio filamentorum adnatis. *Ovarium* subrotundum, quinque-sulcatum, stipitatum, disco glanduloso cinctum. *Stylus* teres, brevissimus. *Stigma* obtusum. *Cocculi* quinque, conniventes, ovati, compressi, truncati, intus et apice dehiscentes, arillo conformi, cartilagineo, similiter dehiscente fети. . . . .

## CROWEA SALIGNA.

CROWEA caule ramisque triquetris, glabris; foliis alternis, lanceolatis, integerrimis; floribus solitariis, axillaribus.

CROWEA saligna. *Andr. Reposit.* 79.

Arbrisseau originaire de la Nouvelle-Hollande, d'un port élégant; garni dans les aisselles des feuilles, de fleurs couleur de rose qui se développent successivement depuis fructidor jusqu'à la fin de frimaire. Il passe l'hiver dans l'orangerie, et se multiplie aisément de boutures.

**TIGE** droite, triangulaire, à angles aigus et saillans, glabre, rameuse, de couleur brune dans sa partie inférieure, d'un vert-cendré dans la supérieure; haute d'un mètre, de la grosseur d'une plume de cygne. **RAMEAUX** alternes, ouverts, plians, de la forme et de la couleur de la tige.

**FEUILLES** alternes, rapprochées, peu ouvertes, sessiles, en lance, amincies à leurs extrémités, très-entières, pointues, relevées en dessous d'une nervure qui se prolonge sur la tige et les rameaux; glabres, ponctuées, d'un vert-gai, répandant, lorsqu'on les froisse, une odeur de cerfeuil, longues de six centimètres, larges de dix millimètres.

**FLEURS** axillaires, solitaires, droites, sessiles, munies de bractées; de couleur rose, larges de trois centimètres.

**BRACTÉES** deux ou trois, à la base des fleurs, ovales, aiguës, munies sur leurs bords de cils peu apparens, très-courtes.

**CALICE** à cinq folioles en forme de spatule, rapprochées en tube dans leur partie inférieure, et se séparant au moindre effort; distinctes dans leur partie supérieure dont les bords sont membraneux, d'une légère teinte purpurine, et munis de cils peu apparens.

**PÉTALES** cinq, insérés sous le disque glanduleux qui entoure la base de l'ovaire, alternes avec les divisions du calice, sessiles, ouverts et un peu recourbés à leur sommet, ovales et en lance, aigus, ponctués, munis sur leurs bords de cils peu apparens.

**ÉTAMINES** dix, attachées au disque qui entoure la base de l'ovaire, deux fois plus courtes que la corolle. **FILETS** alternativement plus courts, planes dans leur moitié inférieure, courbés en dedans, rapprochés en tube, ciliés sur leurs bords, d'un blanc



lavé de rose; filiformes dans leur moitié supérieure, ouverts en étoile, velus et de couleur cendrée. *ANTHÈRES* adhérentes à la partie moyenne des filets, linéaires, à deux loges, s'ouvrant longitudinalement, d'un jaune sale.

*OVAIRE* libre, porté sur un pédicule cylindrique; entouré d'un disque glanduleux; arrondi, creusé de cinq sillons, glabre, d'un vert-foncé. *STYLE* cylindrique, très-court. *STIGMATE* obtus.

*FRUIT* entouré à sa base du calice subsistant; formé de cinq coques très-rapprochées, ovales, légèrement comprimées, tronquées, ridées, de couleur cendrée, s'ouvrant en dedans et à leur sommet, formées de deux enveloppes dont une intérieure cartilagineuse et élastique.

*SEMENCES* . . . . .

*Obs. 1<sup>o</sup>.* Le genre *Crowea* établi par M. Smith dans le 4<sup>e</sup> vol. des *Transactions de la Société Linnéenne de Londres*, appartient à la famille des Rutacées. Il a beaucoup de rapports avec le *Diosma*; mais il en diffère sur-tout par l'absence des écailles alternes avec les pétales, par le nombre des étamines, et par l'ovaire pédiculé.

2<sup>o</sup>. Si les Botanistes jugent que l'ovaire pédiculé offre un caractère plus important que celui de la forme des étamines, pour distinguer le *Crowea* des genres avec lesquels il a le plus d'affinité, il faudra alors examiner sur le vivant l'*Eriostemon* de M. Smith, le *Diosma uniflorum*, Linn., et vérifier si ces deux plantes ne présenteroient pas le caractère que nous avons observé dans le *Crowea saligna*.

3<sup>o</sup>. Les fruits du *Crowea saligna*, qui m'ont été communiqués par M. Kennedy, habile Botaniste et célèbre pépiniériste Anglais, ne contenoient aucune semence.

*Expl. des fig. 1*, Fleur vue par-derrrière. 2, La même dont les folioles du calice sont séparées, pour montrer le pédicule qui porte l'ovaire. 3, La même dont on n'a conservé qu'un pétale, pour montrer l'attache de la corolle et des étamines. 4, Une étamine grossie et vue en dedans. 5, Ovaire pédiculé. 6, Le même grossi, pour montrer le disque glanduleux qui entoure sa base, et auquel sont attachées les étamines. 7, Fruit formé de cinq coques. 8, Une coque séparée. 9, Enveloppe intérieure.