

Le Storie Napoleoniche

a cura del Museo Medagliere dell'Europa Napoleonica

Numero 60 – 28 Ottobre 2023

medaglierenapoleonico@gmail.com

www.medaglierenapoleonico.com

Il Giardino di Josephine

11^a parte

In questa rubrica, mese dopo mese, vi mostreremo quali bellezze floreali contenesse il giardino della Malmaison al tempo di Giuseppina, attraverso le magnifiche incisioni del più grande illustratore botanico del suo tempo, Pierre-Joseph Redouté.

Costui, in collaborazione con un famoso botanico parigino, Etienne Pierre Ventenat, pubblicò dal 1803 al 1806 “Le Jardin de la Malmaison” un’opera divenuta una pietra miliare dell’illustrazione botanica, in cui vengono descritti oltre centoventi specie di rose e non solo, con cui l’amata prima moglie di Napoleone volle impreziosire la loro residenza privata alle porte di Parigi.

Josephine, che non faceva mai nulla di ordinario, non si accontentò di decorare il grande parco che circondava la residenza con specie floreali comuni, volendo invece che vi fossero impiegate solo essenze e specie mai prima impiantate in Francia trasformando così il proprio giardino in una sorta di museo botanico a cielo aperto.

Ancora oggi il giardino conserva alcune delle piante da lei volute anche se il passare del tempo e la mancanza della sua mano amica dei fiori, gli ha fatto perdere gran parte del suo fascino.



Antirrhinum Tricnathospermum

Desseign par L. L. Robur.

Gravé par J. B. L.

ANTIRRHINUM TRIORNITHOPHORUM.

FAM. des SCROPHULAIRES, *JUSS.* — DIDYNAMIE ANGIOSPERMIE,
LINN.

ANTIRRHINUM foliis verticillatis, lanceolatis, trinerviis; caulibus decumbentibus; racemo terminali, paucifloro; floribus maximis, pedunculatis.

ANTIRRHINUM (triornithophorum) foliis quaternis, lanceolatis; caule erecto, ramoso; floribus pedunculatis. *LINN. Spec. Plantar.* 852. *CURTIS, Magaz.* 525.

LINARIA americana maxima, purpureo flore. *HERM. Lugdb.* 576, t. 577.

LINARIA, flore purpureo, americana. *RIVIN. Monopet.* 81.

Plante herbacée, vivace, originaire d'Amérique, remarquable par la grandeur et la beauté de ses fleurs. Elle passe Thiver dans l'orangerie, et fleurit pendant tout l'été et une grande partie de l'automne.

RACINE rampante, garnie de fibres, blanchâtre.

TIGES droites, dures et presque ligneuses vers leur base; herbacées, penchées et même tombantes dans leur partie supérieure; cylindriques, feuillées, rameuses, recouvertes d'une poussière glauque, longues de douze décimètres, de la grosseur d'une plume à écrire. **RAMEAUX** axillaires, verticillés et en nombre égal à celui des feuilles, ayant la direction, la forme et la couleur des tiges.

FEUILLES verticillées, ordinairement au nombre de quatre, quelquefois de trois, rarement de cinq; horizontales, sessiles, en lance, très-entières, pointues, relevées en dessous de trois nervures, creusées en dessus de trois stries; d'un vert foncé sur leur surface supérieure, d'un vert glauque sur l'inférieure, de couleur purpurine sur leurs bords; un peu épaisses, plus courtes que les entre-nœuds.

GRAPPES au sommet des tiges et des rameaux; simples, lâches, obtuses, courtes, munies de bractées.

BRACTÉES verticillées au nombre de trois ou de quatre, parfaitement semblables aux feuilles de la plante et beaucoup plus courtes.

FLEURS en nombre égal à celui des bractées; horizontales, pédiculées, très-grandes, d'un violet terne, se développant successivement.

PÉDICULES naissans dans les aisselles des bractées et plus longs; droits, cylindriques, d'un vert glauque.

CALICE à cinq divisions ouvertes, en lance, pointues, égales, subsistantes, d'une légère teinte purpurine vers leur sommet.

COROLLE monopétale, insérée sur un disque hypogyne, irrégulière, personnée. **TUBE** ventru, rayé, muni d'un éperon sur le côté antérieur de sa base. **ÉPERON** droit, de la longueur de la fleur, en forme de poinçon, d'un violet pâle, parsemé de poils glanduleux et peu apparens. **LÈVRE SUPÉRIEURE** en voûte, à deux lobes arrondis, redressés sur leurs bords, réfléchis à leur sommet. **LÈVRE INFÉRIEURE** à trois découpures

ovales-arrondies, horizontales; la moyenne plus courte, échancrée, munie intérieurement d'un palais saillant, jaunâtre, sillonné longitudinalement.

ÉTAMINES quatre, dont deux plus courtes (*didynames*); attachées à la base du tube, situées sous la lèvre supérieure. *FILETS* légèrement courbés à leur sommet, filiformes, d'un violet pâle, renfermés dans le tube. *ANTHÈRES* vacillantes, rapprochées par paires; arrondies, à deux lobes, d'un jaune soufré.

OVAIRE libre, entouré d'un disque peu saillant; arrondi, creusé d'un sillon sur chaque face, d'un blanc verdâtre. *STYLE* droit, cylindrique, courbé à son sommet, de la couleur des filets. *STIGMATE* un peu renflé, tronqué.

CAPSULE ovale-arrondie, creusée d'un sillon sur chaque face, recouverte par le calice, surmontée du style, divisée en deux loges, s'ouvrant au sommet en huit dents; de couleur cendrée.

PLACENTA central, dilaté sur ses bords qui correspondent chacun aux sillons de la capsule. *CLOISON* formée par les rebords saillans du placenta, s'élevant à son sommet au-dessus de l'écartement des valves.

SEMENCES orbiculaires, comprimées, munies d'un rebord mince, noirâtres.

OBS. 1^o. Les tiges de l'*ANTIRRHINUM triornithophorum* sont penchées, tombantes, et ont besoin de tuteur pour se soutenir. Si elles s'élèvent dans leur pays natal à la hauteur d'un homme (1), il est certain que dans nos climats, elles n'ont jamais plus de douze décimètres de longueur. Les fleurs qui ne s'épanouissent ordinairement que trois ensemble dans chaque verticille, sont horizontales; et comme on a cru qu'elles avoient quelque ressemblance avec des oiseaux, on a donné à l'espèce qui les produit le nom de *triornithophorum*, ou qui porte trois oiseaux.

2^o. J'ai cru devoir conserver à l'espèce que je viens de décrire, le nom d'*ANTIRRHINUM*, sous lequel elle est le plus généralement connue. Je suis néanmoins convaincu qu'il faut la rapporter au genre *LINARIA*, que Linnéus avoit réuni à l'*ANTIRRHINUM*, et qui depuis a été rétabli par le plus grand nombre des Botanistes.

3^o. M. Corrêa de Serra m'a assuré qu'il n'avoit jamais trouvé dans le midi du Portugal l'*ANTIRRHINUM triornithophorum* LINNÉ. Il est probable que la plante mentionnée sous ce nom dans l'édition que M. Vandelli a donnée du *FRIDARIUM Lusitanicum* de Grisley, est une espèce différente.

Expl. des fig. 1, Corolle ouverte pour montrer l'attache des étamines et la forme du palais. 2, Calice et Pistil.

(1) *Planta humanae altitudinis*. LINNÆUS, *Spec. Plant.* 852.